



Scheda tecnica prodotto

Nome: REPELT SHAMPOO - ANTIPARASSITARIO CANI

Codice prodotto: 35019

EAN: 8007229350192

Contenuto: 250 ml

PER USO VETERINARIO

Pz. per cartone: 6

Pz. per strato: 210

Misure pack: 6 x 3,5 x 17,5h cm

Repelt - Shampoo antiparassitario per cani:

Shampoo antiparassitario per il trattamento dei pidocchi, delle pulci, degli acari e delle zecche dei cani.

Composizione - 100g di prodotto contengono:

Principi attivi: Bioalletrina 90% g 0,031

Eccipienti: Empicol LQ33 (Laurilsolfato di monoetanolamina) - Empilan 2502

(Coccoidildietanolamide) - Ammonio cloruro - Sodio Cloruro Acido citrico monoidrato -

Bronopol (2-bromo-2-nitro-1,3-propandiolo) - Colore azzurro (E131) - Lavanda - Acqua

depurata

Posologia per ciascuna specie, via di modalità di somministrazione: Utilizzando un paio di guanti di protezione, bagnare il cane con acqua tiepida ed applicare in più parti una dose di shampoo pari a 10 ml per Kg di peso corporeo (10 ml corrispondono ad un cucchiaino da tavola circa), frizionare con le punte delle dita fino a che la schiuma formata non raggiunga la pelle del cane. Attendere qualche minuto per permettere allo shampoo di esplicare la sua azione antiparassitaria. Al termine effettuare un accurato risciacquo finale. Ripetere il trattamento dopo 3-7 giorni. Non usare il prodotto in quantità eccessiva o impropria.

Per ridurre la re-infestazione dovuta alla comparsa di nuove pulci, si raccomanda di trattare tutti i cani presenti nell'ambiente domestico. Gli altri animali conviventi nello stesso ambiente domestico devono essere trattati con un prodotto idoneo. Per contribuire ulteriormente a ridurre la minaccia ambientale, si raccomanda l'uso aggiuntivo di un idoneo trattamento ambientale contro le pulci adulte ed i loro stadi in via di sviluppo.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali: utilizzare guanti protettivi. Il prodotto è pericoloso per ingestione ed inalazione. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo ogni applicazione. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Conservare lontano da alimenti, bevande o mangimi e dai recipienti destinati a contenerli. Se il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. E' sconsigliato l'uso a soggetti allergici o asmatici.

In caso di malessere consultare il medico mostrandogli l'etichetta/foglio illustrativo. Nell'uomo i sintomi di intossicazione sono: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo, ipertermia, sudorazione.

Non utilizzare in presenza di fiamma o corpi incandescenti. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il sito di applicazione non sia asciutto. Si consiglia di non trattare gli animali durante il giorno ma di trattarli la sera, e se appena trattati non farli dormire con i proprietari, in particolare con i bambini. **Non fumare, bere e mangiare durante l'applicazione.**

Modalità di dispensazione: Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Controindicazioni: L'impiego del prodotto è controindicato nei soggetti ammalati o convalescenti. Non usare su animali con ipersensibilità accertata ai principi attivi o qualsiasi altro eccipiente. E' comunque sconsigliato l'uso del prodotto su animali sensibili (asmatici, allergici, ecc.).

Reazioni avverse: In soggetti predisposti si possono manifestare eventi allergici. In caso di reazione cutanea o di malessere, contattare il veterinario. Segnalare al medico veterinario eventuali reazioni avverse e/o reazioni non menzionate nell'etichetta/foglio illustrativo. Non superare la dose consigliata.

IMPIEGO DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO: non usare il prodotto in animali in gravidanza ed in allattamento.

INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI ED ALTRE FORME DI INTERAZIONE: non somministrare contemporaneamente ad altri antiparassitari. Non sono note incompatibilità con altri medicinali.

SOVRADOSAGGIO: (sintomi, procedure d'urgenza, antidoti)

Non superare le dosi consigliate. In caso di reazione cutanea o sintomi di intossicazione (tremori, convulsioni, secrezioni respiratorie, eccessiva salivazione) sospendere il trattamento e contattare il veterinario mostrandogli l'etichetta/foglio illustrativo. In caso di ingestione somministrare per bocca, una sospensione acquosa di carbone attivato, previa consultazione del medico veterinario. In ogni caso, non superare le dosi consigliate, evitando un uso eccessivo ed improprio.

INCOMPATIBILITÀ: in assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

PRECAUZIONI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVANTI DAL SUO UTILIZZO: tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. Il prodotto inutilizzato, o gli eventuali materiali di rifiuto, devono essere eliminati negli appositi contenitori della raccolta differenziata dei medicinali scaduti. Il prodotto ed i contenitori vuoti non devono essere dispersi nei corsi d'acqua poiché potrebbero essere pericolosi per i pesci o per altri organismi acquatici.

Uso veterinario – uso esterno – da non ingerire.

VALIDITÀ: 24 mesi. **La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.**